



1



2



3



4

- 1- *Neoregelia carolinae* (Beer) L.B.Sm. variedad tricolor cultivar Vandurme. (Vandurme), Captada por: Adriana Pico-V. (Jardín Botánico de Bogotá). Lugar: Jardín Botánico de Bogotá, Colombia.
2- *Hohenbergia stellata* Schult. & Schult. f. (Hohenbergia), Captada por: Adriana Pico-V. (Jardín Botánico de Bogotá). Colección personal de Adriana Pico-V., en Bogotá, Colombia.
3- *Artocarpus altilis* (Parkinson) Fosberg (Árbol del pan). Captada por: José L. Martínez. (Universidad de Santiago de Chile). Lugar: Campus Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia.
4- *Orquidea phalaenopsis* Blume (Orquídea mariposa). Captada por: José L. Martínez. (Universidad de Santiago de Chile). Lugar: Cenivam, Bucaramanga, Colombia.

Artículos | Articles

- Letelier *et al.*, (Chile). Herbal extract differentially inhibit oxidative effects caused by the biotransformation of nifurtimox, nitrofurantoin and acetaminophen on rat liver microsomes.
- Pereira *et al.*, (Brasil). Anatomical aspects, chemical analysis and cytotoxic effect of the essential oil from leaves of *Vasearia arborea* (Salicaceae).
- Babazadeh-Darjazi (Irán). Study on peel components and juice quality of three mandarin hybrids (*Citrus reticulata*) on sour orange rootstock cultivated in Ramsar, Iran.
- Prochnow *et al.*, (Brasil). Chemical composition of the essential oil of *Aloysia triphylla* (L'Hér) Britton due to water deficit and seasonality.
- Soria *et al.*, (Paraguay). Descripción de *Tesaria dodeneifolia* (Kok. & Arn.) Cabrera, (Asteraceae), "la planta dulce" como endulzante natural.
- Castañeda *et al.*, (Perú). Leguminosas (Fabaceae) silvestres de uso medicinal del distrito de Lircay, provincia de Angaraes (Huancavelica, Perú).
- Lins *et al.*, (Brasil). Attenuation of motor déficits by hydroethanolic extract of *Poincianella pyramidalis* in a Parkinson's disease model.